



ഗ്രാമീൺ കൃഷി മൗസം സേവാ
കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിൻ,ഇടുക്കിജില്ല



എ.എ.ബി ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ.:40/ 2025-2026

ദിവസം&തീയതി: ചൊവ്വാഴ്ച, 20.05.2025

കഴിഞ്ഞ വാരത്തിലെ സംക്ഷിപ്ത കാലാവസ്ഥ (Dated 13.05.25 to 19.05.25)							കാലാവസ്ഥാഘടകങ്ങൾ	കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം: (Valid for 21.05.25 to 25.05.2025)				
13/05	14/05	15/05	16/05	17/05	18/05	19/05	തീയതി	21/05	22/05	23/05	24/05	25/05
0	0	1	4.2	0	0	0	മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	10	3	2	20	12
25.7	25.7	24.5	25.5	24.7	23.7	25	ഉയർന്ന താപനില (°C)	27	27	27	27	27
22.5	22.5	21.5	22.5	21.5	20.5	21.5	കുറഞ്ഞ താപനില(°C)	21	21	21	21	21
81	78	84	85	81	88	81	കുടിയാനത്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	96	96	96	96	96
							കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	75	75	75	75	75
							കാറ്റിന്റെവേഗത(കിലോ മീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	5	3	3	4	3
SWS	NNW	SWS	SWS	NNW	SWN	SWS	കാറ്റിന്റെദിശ(ഡിഗ്രി)	270	270	230	230	270
7	7	7	7	7	7	7	മോലവ്യാപ്തി(ഒക്ട)	8	7	7	8	8

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ : അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മിതമായതോ കനത്തതോ ആയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വിഭാഗം	കാർഷിക/മുഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ് (കൊമ്പൻചെല്ലി)	തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡവുത്തിയാക്കുക . കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും ചെല്ലി കോൽ ഉപയോഗിച്ചു ചെല്ലിയെ പുറത്തെടുക്കുക തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മുറിപ്പാടുകളിൽ ബോർഡോ കൂഴമ്പ് പുരട്ടുക. 1. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് 250 ഗ്രാം + 250 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത് ഏപ്രിൽ മെയ് , സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഓലക്കവിളുകളിൽ ഇടുക. 2. തെങ്ങിന്റെ മണ്ടവുത്തിയാക്കിയ ശേഷം 20 ഗ്രാം കാർടാപ് ഫൈഡ്രോക്സൈഡ് 200 ഗ്രാം മണലും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം ജനുവരി, മെയ് , സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇടവിട്ടുള്ള മഴയോടുകൂടിയുള്ള അന്തരീക്ഷവസ്ഥ ഫൈറോഫ്ത്തോറ മുലമുള്ള മണ്ട ചീയലിനു അനുകൂലമാണ് . ഇതിനെതിരെ മുൻകരുതലായി 1 % വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം പശചേർത്ത് തളിച്ചുകൊടുക്കുക
കമുക (മഹാളി)	കൃഷിയിടം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക കൊഴിഞ്ഞുപോയ അടക്കുകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുക. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കുലകളിലും ഇലകളിലും തളിച്ചു കൊടുക്കുക.
കുരുമുളക് (ചീച്ചൽ രോഗം)	മുൻകരുതലായി ട്രൈക്കോഡെർമ്മ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചാണകം മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ റെഡോമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണിൽ കുതിർത്തുക. ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലായി 150 ഗ്രാം ട്രൈക്കോഡെർമ്മ സംബുഷിപ്പികരിച്ച ചാണകപ്പൊടി കുരുമുളകിന്റെ തടത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു മണ്ണ് കയറ്റികൊടുക്കുക
വാഴ	വേനൽ മഴയോടെ കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ താങ്ങു കാലുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്.ഇലപ്പുളളി രോഗത്തിന് അനുകൂല അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ്.ഇതിനെതിരെ കർഷകർജാഗ്രത പുലർത്തുക
ഇഞ്ചി/മഞ്ഞൾ (നടുന സമയം)	വാട്ടം /ചീച്ചൽ മുൻകരുതലായി നടുന സമയം നിലമൊരുക്കുമ്പോൾ ട്രൈക്കോഡെർമ്മ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകം (100 കിലോഗ്രാം ചാണകത്തിൽ ഒരു കിലോ ഗ്രാം ട്രൈക്കോഡെർമ്മ) ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 100 ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 25 ഗ്രാം വീതം ട്രൈക്കോഡെർമ്മ മണ്ണിൽ നേരിട്ട് ചേർത്തു യോജിപ്പിക്കുക.
ഏലം	ഏല തോട്ടങ്ങളിൽ കീട നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ് . തണ്ടുതുരപ്പന്റെ ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ക്ലോറാൻട്രാനിലി പ്രോൾ 3 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു മഴയൊഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ് . കട്ടെ രോഗം ബാധിച്ച ഏല ചെടികൾ പിഴുതു മാറ്റുക . അഴുകൽ രോഗത്തിനെതിരെ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നീർ വാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക
കാപ്പി	നിലവിലുള്ള അന്തരീക്ഷവസ്ഥയിൽ കായ അഴുകൽ രോഗത്തിന് സാധ്യത കൂടുന്നു . ഇതിനെതിരെ മുൻകരുതലായി 0 .5 % വീര്യത്തിൽ പശചേർത്തു തളിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
പച്ചക്കറികൾ	വെള്ളരിവർഗ പച്ചക്കറികൾ നടാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ് .വെണ്ടയുടെ ഇലചുരുട്ടിപുഴു, മണ്ഡരി എന്നിവയുടെ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത
മുഗ സംരക്ഷണം	കാലിത്തീറ്റ സംഭരിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നനവ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴി ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഒഴിവാക്കാം.എലികളുടെ ആക്രമണം തടയുക വഴി എലിപ്പനി രോഗം തടയുന്നതിനായി തൊഴുത്തും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചപ്പുചവറുകളും വൃത്തിയാക്കി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പ്രാദേശികകാർഷികഗവേഷണകേന്ദ്രം അമ്പലവയലും ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥാവകുപ്പും സംയുക്തമായിഭാരതീയ കാലാവസ്ഥാവകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്

