



കാർഷികകാലാവസ്ഥബുള്ളറ്റിൻ - കോട്ടയം ജില്ല

ഫോൺ:0481-2524421 - ഇമെയിൽ: amfukumarakom@gmail.com

നമ്പർ: Ala-46/2025 മകയിരം ഞാറ്റുവേല തീയതി: 10.06.2025 ഇടവം 27



(ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷശാസ്ത്രവിഭാഗം, ന്യൂഡൽഹിയുടെ ജില്ലാ തല കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്).

(കാർഷിക കാലാവസ്ഥ പിൽഡ് യൂണിറ്റ്, പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കുമരകം, ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രവിഭാഗംഎന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

കഴിഞ്ഞവാരം -സംക്ഷിപ്തകാലാവസ്ഥ (05/06/25- 09/06/25)	കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം (06/06/25 - 10/06/25)
കഴിഞ്ഞ വാരത്തിലെ ഉയർന്ന താപനില 33.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 24.3 സെൽഷ്യസ് വരെയും ആയിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത 76 -നും 95 നും ഇടയിലും പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 5 കിലോമീറ്റർ വരെയുമായിരുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഈ കാലയളവിൽ 40 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അടുത്ത മൂന്നു ദിവസം നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള രണ്ടു ദിവസം സാമാന്യം ശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 3 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരമാവധി താപനില 33°C യും കുറഞ്ഞ താപനില 23°Cയും ആയിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത 75% നും 90% നും ഇടയിൽ. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത 3 കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആകാശം പൂർണ്ണമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും

കാർഷികകാലാവസ്ഥമുന്നറിയിപ്പുകൾ: നിലവിലുള്ള അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ കൃഷിക്കാർ ചുവടെ പറയുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ		പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിന്റെ അമ്ളത കുറക്കാൻ ഒരു സെന്റിന് ഒരു കിലോ കുമ്മായം എന്ന തോതിൽ ഇടു കൊടുക്കുക.
തെങ്ങ്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുളിപ്പിച്ച കളോ പൈനാപ്പിളോ കൊണ്ട് തെങ്ങും തടിയിൽ കെണി ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്രകാരം കെണിയിൽ വീഴുന്ന ചെല്ലിയെ കൊല്ലാൻ ഏതെങ്കിലും കീടനാശാനി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
വാഴ	വളർച്ചാ ഘട്ടം	വാഴയുടെ സീറൈട്ടോക്ക ഇലകരിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഇലകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി പ്രൊപ്പിക്കോനാസോൾ ഒരു മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിച്ചുകൊടുക്കുക.
കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ വിളകൾ	നടീൽ	ചേമ്പ് നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ശ്രീ രശ്മി, ശ്രീ പല്ലവി, ശ്രീകിരൺ എന്നീ ഇനങ്ങൾ നടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 35 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന പിള്ള ചേമ്പുകൾ വേണം നടാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ. വരമ്പുകളിൽ നടുമ്പോൾ 2 ചേമ്പുകൾ തമ്മിൽ 45 സെന്റിമീറ്റർ അകലം വേണം.കാലിവളം ഹെക്ടറിനു 12 കിലോഗ്രാം എന്ന തോതിൽ അടിവളമായി നൽകണം.
പടവലം	വളർച്ചാ ഘട്ടം	നിലവിലുള്ള അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ ഇലചുരുട്ടി പുഴുവിന്റെയും പച്ചത്തുളളിന്റെയും ആക്രമണത്തിന്സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 3 ഗ്രാം തയാമെത്തോക്സാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക.