കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ - തിരുവനന്തപുരംജില്ല

(ദക്ഷിണ മേഖലകാർഷികഗവേഷണകേന്ദ്രം വെള്ളായണിയും, ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥവകുപ്പും സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

നമ്പർ:TVM-AAS-32/2025, (64) തീയ്യതി: 12.08.2025

കഴിഞ്ഞആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി

മഴ(മില്ലി.മീറ്റർ)	ഉയർന്ന താപനില (°C)	കുറഞ്ഞ താപനില(°C)	അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	ബാഷ്പീകരണം(മില്ലി.മീറ്റർ)
3.4	28.6-31.2	22.1-22.5	77-95	1.2-4.0

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ	13/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	16/08/2025	17/08/2025
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	4	5	4.5	6	5
ഉയർന്നതാപനില(° C)	30	30	30	30	30
കുറഞ്ഞതാപനില(° C)	25	25	25	25	25
കൂടിയഅന്തരീക്ഷആർദ്രത (%)	96	96	96	96	96
കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷആർദ്രത(%)	74	74	74	74	74
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ /മണിക്കൂർ)	5	4	4	3	4
കാറ്റിന്റെദിശ (ഡിഗ്രി)	320	320	320	320	270
മേഘവ്യാപ്തി(ഒക്ട)	8	8	7	8	7
കാലാവസ്ഥസംഗ്രഹം/അലേർട്ട്	ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സാധരണയിൽ കുറവ് തോതിലുമുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.				
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ശരിയായ നീർവാർച്ച സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുക വാഴകൾക്ക് താങ്ങുകാലുകൾ നൽകുക പച്ചക്കറി പന്തലുകൾ ബലപ്പെടുത്തുക. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത്മാത്രം കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുക മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ശരിയായ പുതയിടൽ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക.				

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അഭാവം	മണ്ണ്പരിശോധനാറിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മ്യൂറിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് പ്രയോഗിക്കുക.കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളമൈറ്റ്നൽകി മണ്ണിന്റെpH ക്രമീകരിക്കുക. ജൈവവളവും ചാമ്പലും മണ്ണിൽ ചേർക്കുക. ഒരു അടിയന്തര പരിഹാരമായി സൾഫേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് (SOP) ഇലകളിൽ (10 ഗ്രാം/ലിറ്റർ) രാവിലത്തെ സമയങ്ങളിൽ തളിക്കുക.
വാഴ	മാണ വണ്ട്	മാണ വണ്ടിൻറെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക . തയാമെത്തോക്സാം 25 WG (2 ഗ്രാം/10 ലിറ്റർ) അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.3G (10 ഗ്രാം/ചെടി) എന്നിവ

		പ്രയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് നടീലിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണ പ്രയോഗിക്കുക
പച്ചക്കറി (വഴുതന)	വാട്ടരോഗം	ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാവുന്ന വാട്ടരോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ നീക്കം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക. വിത്തുകൾ സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് (20 ഗ്രാം/ലിറ്റർ/കിലോഗ്രാം വിത്ത്) ഉപയോഗിച്ച് പരിചരിക്കുക, സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് ചേർത്ത വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മണ്ണിൽ ഇടുക
മൃഗസംരക്ഷണം	കോഴിക്കൂടുകളിലെബെഡ്ഡിങ്ഇടയ്ക്കിടെഇളക്കികൊടുക്കുക.ശരിയായവായുസഞ്ചാരംനൽകിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നഈർപ്പംകുറയ്ക്കുക.	